

Errata corrige volume Farmacologia e Tossicologia clinica – isbn 9788836231195

Al capitolo 1, quesito n. 70, la risposta corretta è la B.

Al capitolo 1, quesito n. 90, la risposta corretta è la E.

Al capitolo 2, quesito n. 61, la risposta corretta è la E. Pertanto il commento al quesito va sostituito col seguente:

“61) E. Le infezioni erpetiche, causate principalmente da HSV-1 (Herpes Simplex Virus di tipo 1), HSV-2 (Herpes Simplex Virus di tipo 2) e VZV (Varicella-Zoster Virus), vengono trattate con farmaci antivirali che inibiscono la replicazione del DNA virale. Il più utilizzato è aciclovir, efficace contro tutti e tre i virus, disponibile in forma orale, topica e endovenosa. Il valaciclovir, suo profarmaco, ha una migliore biodisponibilità ed è preferito per uso orale. Anche famciclovir, trasformato in penciclovir, è usato per trattare HSV (Herpes Simplex Virus) e VZV (Varicella-Zoster Virus) con un dosaggio meno frequente. In casi resistenti o gravi si usano antivirali come foscarnet e cidofovir, più potenti ma anche più tossici. La scelta del farmaco dipende dal tipo e dalla gravità dell’infezione e dallo stato del paziente.”

Al capitolo 2, quesito n. 63, la domanda va riformulata e sostituita con la seguente:

“63) Quale delle seguenti affermazioni concernenti l’acido clavulanico è ERRATA?”

Al capitolo 5, quesito n. 2, la risposta corretta è la A.

Al capitolo 5, quesito n. 78, la risposta corretta è la B.

Al capitolo 6, quesito n. 25, la risposta corretta è la E.